



برداشتن رحم از طرف شکم و واژن

TAH+TVH

زیر نظر: خانم صمدپور (بهبود کیفیت)

تدوین: خانم مزارعی (واحد آموزش سلامت)

زیر نظر: دکتر پوربرقه ای (مسئول علمی زنان)

بهار ۱۴۰۴

۶

قبل از هیستروکتومی



بعد از هیستروکتومی



۸- پس از عمل جراحی، رحم خارج شده جهت بررسی وجود یا عدم وجود بیماری بدخیم و... به آزمایشگاه پاتولوژی فرستاده می شود و جواب این آزمایش باید حتما به پزشک معالج نشان داده شود.

گزارش پاتولوژی:

از روز هفتم بعد از عمل بین ساعت ۴-۷ بعد از ظهر با در دست داشتن قبض پذیرش آزمایشگاه جهت دریافت جواب پاتولوژی به آزمایشگاه مراجعه کنید.

منبع: بیماریهای زنان کیسترن

۵

برش جراحی



www.payamesalamat.com

۵- بعد از عمل از جوراب ضد واریس برای پیشگیری از لخته و آمبولی استفاده نمایید.
۶- استحمام از روز دوم بعد از عمل و بلافاصله بعد از برداشتن پانسمان بصورت روزانه انجام می گیرد و بهتر است بعد از حمام محل زخم با شوار کاملاً خشک شود.

۷- در صورتی که طی این عمل هر دو تخمدان شما نیز برداشته شود علائم یائسگی همانند گر گرفتگی و تعریق بروز می کند و در این شرایط معمولاً پیاده روی و مصرف کلسیم برای جلوگیری از پوکی استخوان توصیه می شود.

۴

به معنای برداشتن رحم به وسیله عمل جراحی و یکی از شایع ترین اعمال جراحی می باشد.

هیستریکتومی شکمی شایع ترین نوع آن بوده و شامل خارج ساختن رحم و سرویکس (گردن، رحم) می باشد. در این نوع عمل جای زخم در بالهای واژن و شکم باقی خواهد ماند.

مزیت خارج کردن سرویکس در این روش این است که از تغییرات سلولی که منجر به ایجاد سرطان شود جلوگیری می گردد. نوع دیگر هیستریکتومی واژنی است که با برش در بالهای واژن (بدون ایجاد برش در شکم) رحم و سرویکس خارج می گردد.

چه کسانی نیاز به هیستریکتومی دارند:

۱- ناهنجاری های شایع شامل خونریزی های شدید که معمولا به درمان های دیگر جواب ندهد

۲- چسبندگی های شدید رحمی که معمولا قاعدگی دردناک به همراه دارند.

۳- افتادگی رحم در مواردی که بیمار مسن باشد.

۴- کیست رحمی که معمولا بدخیم باشد.

۵- بعضی از بیماری های رحمی بنا به تشخیص پزشک زنان و زایمان

توجه: توصیه می گردد در موارد هیستریکتومی شکمی در صورتی که سن بیمار بالاتر از ۴۵ سال باشد، تخمدان ها نیز خارج می گردند.

اقدامات جهت عمل:

۱- آزمایش های هموگلوبین خون و گروه خون

۲- رزرو خون

۳- نوار قلب و عکس قفسه سینه در سنین بالاتر از ۴۰ سال

مشاور با پزشک متخصص داخلی در بیماران بالاتر از ۵۰ سال و در بعضی موارد بنابه تشخیص پزشک معالج

توصیه های قبل از عمل:

۱- ساعت ۱۲ شب قبل از عمل از خوردن غذا و آشامیدن خودداری کنید.

۲- دوش گرفتن قبل از عمل

۳- در صورت داشتن دندان مصنوعی هنگام رفتن به اتاق عمل، از دهان خارج کنید.

۴- در هنگام مراجعه زیورآلات با خود به همراه نداشته باشید.

توصیه های بعد از عمل:

۱- از خوردن غذاهای نفاخ مانند (حبوبات) تا چند روز خودداری کنید.

۲- روز هشتم جهت کشیدن بخیه ها به مطب پزشک مراجعه شود.

۳- روز دوم بعد از ترخیص پانسمان تعویض شود.

۴- ادامه دستورات دارویی تا پایان یافتن داروها