

آشنایی با داروی کلگزان

شکل دارویی و مکانیزم اثر این دارو به صورت آمپول های داخل سرنگ در انواع ۲۰ و ۴۰ و ۶۰ و ۱۰۰ میلی گرم می باشد. این دارو ضد انعقاد است و از تشکیل لخته های خونی جلوگیری می کند. ♦

موارد مصرف این دارو در پیشگیری از ایجاد لخته ی خون در بیماران تحت جراحی ران یا زانو، جهت پیشگیری از حمله ی قلبی و نیز در تمام مواردی که نیاز به درمان لخته ی خون می باشد، به کار می رود. کلگزان در ترومبوز وریدهای عمقی یعنی شرایطی که منجر به ایجاد لخته ی خون در عروق ساق پا می گردد، نیز به کار می رود. این لخته ها می توانند به ریه ها مهاجرت کنند و رگ های خونی را مسدود نمایند و یا آمبولی ریوی ایجاد کنند. ♦

عوارض جانبی شایع ترین عوارض جانبی داروی کلگزان شامل کبودی، سفتی، درد و قرمزی در محل تزریق می باشد. از عوارض غیر شایع تر، سردرد شدید و ناگهانی (که می تواند نشانه ی خونریزی مغزی باشد) و نیز خونریزی معده است. اگر فرد به داروی کلگزان، حساسیت داشته باشد عالیم آن شامل راش، مشکلات تنفسی و تورم لب ها، صورت، گلو یا زبان می باشد.



♦ محل تزریق آمپول کلگزان را باید در بافت زیر جلدی به صورت عمیق تزریق نمود (بافت زیر جلدی، بافتی چربی دار است که بین پوست و ماهیچه قرار دارد). بهترین محل برای تزریق این دارو، تزریق آن در کناره های قدامی یا تحتانی شکم می باشد. ناحیه ی تزریق ایده آل در حدود ۱۳ سانتی متر در هر طرف ناف می باشد (حداقل ۵ سانتی مترفاصله از ناف). محل تزریق باید روزانه به تناوب تعویض شود یعنی اگر دیروز تزریق در سمت راست شکم انجام شده امروز باید تزریق در سمت چپ صورت گیرد و همین طور ادامه یابد.



گروه پزشکی شفا
بیمارستان و زایشگاه



آشنایی با داروی کلگزان یا اناکسوپرین

منابع:

فارماکولوژی برای پرستار دکتر متقی نژاد (چاپ سوم)

علائم هشدار:

در صورت بروز موارد زیر به پزشك خود اطلاع دهید

• خونریزی از لثه یا بینی که در یکی دو دقیقه بند نیاید •

خونریزی از زخم که با فشار بر روی آن بند نیاید •

وجود خون در ادرار یا مدفوع • سیاه رنگ شدن مدفوع • استفراغ خونی

خونمردگی یا کبودی های پوستی که بدون دلیل و خودبخود ایجاد شوند •

هر موقع که به سر شما ضربه شدیدی وارد میشود •

درد، تورم، قرمزی یا گرم شدن در پاها یا دست

بروز تنگی نفس

درد قفسه سینه یا طپش قلب

احساس ضعف

♦ روش تزریق و نکات مهم

سرنگ را به گونه ای در بین انگشت های شست و نشانه ی خود بگیرید که انگار قلم در دست دارید . قسمتی از پوست ناحیه ی شکم را نیشگون مانند بالا بیاورید و سپس سرنگ را در حالت ۹۰ درجه تا آخر وارد محل برجسته کنید.

حباب هوای داخل سرنگ نباید قبل از تزریق از داخل سرنگ خارج گردد یعنی سرنگ را هواگیری نکنید زیرا موقع هوا گیری سرنگ ممکن است چند قطره از دارو هم خارج گردد که باعث کاهش دوز دارو میگردد و همچنین هوا گیری باعث کبود شدن محل تزریق میگردد • . محل تزریق را با پنبه آغشته به الکل ضد عفونی کنید و اجازه دهید تا خشک شود. در پوش سر سوزن را در جهت طولی از روی آن خارج نمایید . • پوست را بین انگشت شست و نشانه بگیرید تا یک چین پوستی ایجاد شود • . تمامی طول سوزن را به صورت عمودی (۹۰ درجه) در چین پوستی ایجاد شده وارد کنید • . دارو را به آهستگی تزریق نمایید و چین پوستی را در طول تزریق رها نکنید • . پس از پایان تزریق ، سوزن را به طور مستقیم خارج کرده و چین پوستی را رها کنید • . از ماساژ دادن محل تزریق خودداری کنید • . سرنگ را به طرف پایین و به دور از خود و دیگران بگیرید • . سرنگ استفاده شده را در محفظه ای ایمن ببندازید ♦ . پس از تزریق • امکان دارد که تا حدود ۲۰ دقیقه بعد از تزریق، در محل تزریق احساس سوزش و گزگز کنید. جای هیچگونه نگرانی نیست فقط ناحیه ی تزریق را ماساژ ندهید زیرا سبب کبودی در ناحیه ی تزریق می گردد

همانطور که محل برجسته در دست شماست تزریق را به آرامی و با دقت انجام دهید تا جایی که تمام کگلزان موجود در سرنگ خالی شود • . هنگام تزریق ، بیمار در وضعیت دراز کشیده باشد • جهت حفظ سطح پالسمای دارو، آن را هر روز در ساعت معین تجویز نمایید • . تزریق داخل عضلانی آن ممنوع می باشد • . دارو در دمای ۱۵-۲۵ درجه سانتیگراد نگهداری شود و از یخ زدگی جلوگیری گردد • . اگر یک مرحله کگلزان را فراموش کردید ، به محض یادآوری ، هرچه سریعتر آن را تزریق کنید • هنگام اصلاح و استفاده از چاقو و سایر ابزارهای برنده دقت کافی به عمل آورید • قبل از تزریق، دست خود را با آب و صابون بشویید و سپس خشک کنید.

شناسنامه پروشور آموزشی

SH-HT-PM-17-01

عنوان	آشنایی با آمپول اناکسوپرین
تهیه کننده	س. مزارعی (سوپروایزر آموزشی سلامت)
تایید کننده	دکتر بنی هاشمی (مسئول علمی)
سال تهیه	بهار ۱۴۰۴